

ANÁLISE DO PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE MULHERES COM LAUDO HISTOPATOLÓGICO DE COLO DE ÚTERO PARA CARCINOMA EPIDERMÓIDE NO AMAZONAS ENTRE 2021 A 2024

III Congresso Médico Online de Ginecologia e Obstetrícia, 3ª edição, de 23/09/2024 a 24/09/2024

ISBN dos Anais: 978-65-5465-118-9

DOI: 10.54265/NVCP7453

NEVES; Vivian Lis Canto Belmont¹, CATTANEO; Sara Gabriella de Azevedo², ATHAYDE; Hillary Stephany Sá³, VAZ; Ana Beatriz Queiroz Negro⁴, MORAES; Ane Carolyne Messias de⁵

RESUMO

INTRODUÇÃO: O carcinoma epidermóide de colo uterino é uma das neoplasias malignas mais comuns entre mulheres, especialmente em países em desenvolvimento como o Brasil, onde a incidência é alarmante devido a desigualdades no acesso à saúde. O Amazonas apresenta um cenário único, influenciado por fatores geográficos e socioeconômicos. Entre 2021 e 2024, a conscientização sobre a saúde da mulher pode ter impactado o perfil epidemiológico das diagnosticadas. Este estudo analisa o perfil epidemiológico das mulheres com laudo histopatológico de carcinoma epidermóide no Amazonas, considerando variáveis demográficas e clínicas. Compreender esses fatores é essencial para formular políticas públicas eficazes para a prevenção e tratamento da doença. **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico das mulheres com laudo histopatológico de colo de útero para carcinoma epidermóide no Amazonas entre 2021 a 2024. **MÉTODOS:** Estudo de natureza observacional e tipologia transversal, realizado a partir de análise quantitativa e descritiva. Os dados foram coletados através do Sistema de Informação de Câncer (SISCAN), disponibilizado pelo Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis abordadas foram: pacientes por laudo histológico de carcinoma epidermóide segundo a faixa etária entre os anos 2021 a 2024. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** A análise dos dados mostra que o total de mulheres com laudo de carcinoma epidermóide foi de 57. Deste resultado, 17,54% são mulheres de 30 a 34 anos, 15,78% de 35 a 39 anos, 12,28% de 40 a 44 anos, 21,05% de 45 a 49 anos, 17,54% de 50 a 54 anos e 14,78% de 55 a 59 anos. Observa-se um aumento no número de laudos de carcinoma epidermóide de 2021 a 2024, com mulheres de 45 a 49 anos sendo as mais diagnosticadas, seguidas pelas de 50 a 54 anos. Por outro lado, as mulheres com idade entre 40 a 44 anos foram as que menos receberam o diagnóstico. Segundo a literatura, o câncer de colo do útero é raro em mulheres com até 30 anos, e a mortalidade aumenta progressivamente a partir da quarta década de vida. Historicamente, cerca de 70% das mortes por câncer do colo de útero ocorrem na faixa etária de 25 a 64 anos. Apesar do aumento de laudos para carcinoma epidermóide ao longo dos anos, 2021 foi o ano com o menor quantitativo, o que sugere uma possível subnotificação dos laudos durante o período da pandemia de COVID-19. **CONCLUSÃO:** A análise dos laudos de carcinoma epidermóide do colo de útero entre 2021 e 2024 identificou 57 diagnósticos, com maior prevalência na faixa etária de 45 a 49 anos, indicando a necessidade de rastreamento direcionado. O aumento dos laudos sugere maior detecção, mas o menor número em 2021 pode refletir subnotificação devido à pandemia de COVID-19, ressaltando a importância do acesso contínuo à triagem. É crucial implementar políticas públicas para melhorar a detecção precoce e o tratamento, focando nas

¹ FACULDADE METROPOLITANA DO MANAUS, viviancanto77@gmail.com

² FACULDADE METROPOLITANA DO MANAUS, saracattaneo203@gmail.com

³ FACULDADE METROPOLITANA DO MANAUS, hillaryathayde123@gmail.com

⁴ FACULDADE METROPOLITANA DO MANAUS, biazqvaz@gmail.com

⁵ FACULDADE METROPOLITANA DO MANAUS, carolynecarolyne1206@gmail.com

faixas etárias mais afetadas. A coleta e análise de dados devem continuar para monitorar tendências e adaptar estratégias de saúde pública, visando reduzir a mortalidade e promover a saúde das mulheres no Amazonas.

PALAVRAS-CHAVE: Câncer de Colo de Útero, Carcinoma Epidermóide, Laudo Histopatológico, Perfil Epidemiológico, Amazonas