

## ANÁLISE DOS ÓBITOS DECORRENTES DE HERNIORRAFIA COM RESSECÇÃO INTESTINAL NO BRASIL DE 2020 A 2023

IV Congresso Online de Cirurgia, 1ª edição, de 28/10/2024 a 29/10/2024

ISBN dos Anais: 978-65-5465-116-5

DOI: 10.54265/QGLP8570

**BENTO; Rafael**<sup>1</sup>, **TYBUCHESKI; Giovani**<sup>2</sup>

### RESUMO

**Introdução:** A herniorrafia com ressecção intestinal consiste em um procedimento cirúrgico para o fechamento de um anel herniário (hérnia) com a recolocação do conteúdo do saco herniário no seu lugar e a remoção do segmento intestinal que está morto, realizando após isto, os pontos cirúrgicos. Fatores como obesidade, problemas pulmonares, idade avançada, tabagismo, são condições que podem favorecer o surgimento de uma hérnia adquirida, sendo os homens mais susceptíveis comparados com as mulheres para apresentarem propensão a problemas na parede abdominal. **Objetivo:** O presente estudo tem como objetivo analisar os óbitos causados por herniorrafia com ressecção intestinal ocorridos nas regiões do Brasil no período entre 2020 e 2023. **Método:** Trata-se de um estudo observacional transversal cujos dados foram obtidos a partir de consultas realizadas no Sistema de Informação Hospitalar (SIH/SUS), através do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). Foram analisadas variáveis como número de óbitos decorrentes de herniorrafia com ressecção intestinal, realizadas entre 2020 e 2023, incluindo as regiões, unidades da federação e ano de processamento. **Resultados:** No período, foram registrados 129 óbitos decorrentes da herniorrafia com ressecção intestinal no Brasil. A região sudeste concentrou o maior número de casos, com 48 óbitos, representando 37% do total. Em seguida, a região nordeste registrou 40 óbitos (31%), a centro-oeste teve 19 (15%) e a região sul apresentou 14 óbitos (11%). A região norte foi a que apresentou o menor número de mortes, com apenas 8 casos notificados, correspondendo a 6% do total. Estes resultados podem estar relacionados ao menor acesso a serviços de saúde de qualidade e à escassez de profissionais especializados em cada região. **Conclusão:** Os dados analisados indicam que a herniorrafia com ressecção intestinal, apesar de ser um procedimento necessário e amplamente realizado no Brasil, está associada a uma taxa significativa de mortalidade. Esses achados destacam a necessidade de investigações mais aprofundadas sobre os fatores que influenciam a mortalidade associada à herniorrafia, bem como a análise das disparidades regionais no manejo pós-operatório, visando à melhoria contínua dos cuidados de saúde e à redução da mortalidade relacionada a essa cirurgia.

<sup>1</sup> unifaa, rafaelbento240@gmail.com

<sup>2</sup> unifebe, giovani.tybucheski@unifebe.edu.br

