

# TRANSTORNOS PSIQUIÁTRICOS PRÉVIOS EM PACIENTES VÍTIMAS DE QUEIMADURAS: ESTUDO RETROSPECTIVO EM UNIDADE DE REFERÊNCIA DE TERAPIA INTENSIVA EM QUEIMADOS

XXXVII CONGRESSO CIENTÍFICO DOS ACADÊMICOS DE MEDICINA, 37ª edição, de 23/10/2023 a 26/10/2023  
ISBN dos Anais: 978-65-5465-062-5

**BAUER; Rafael Binotto**<sup>1</sup>, **HANSEN; Elisa Klug**<sup>2</sup>, **RANIERI; Raiane Alvarenga**<sup>3</sup>, **MAEDA; Valéria Yumi Yamaguchi**<sup>4</sup>, **FRANCK; Claudio Luciano**<sup>5</sup>

## RESUMO

**INTRODUÇÃO:** Queimaduras são traumas de diferentes etiologias classificados conforme profundidade e extensão, causando comprometimento metabólico, psicológico e emocional, interferindo em relações interpessoais e laborais. A literatura atual sugere maior propensão de pacientes psiquiátricos - esquizofrênicos, dependentes de álcool/outras drogas e portadores de transtornos neurológicos e do humor - a desfechos graves quando queimados. **OBJETIVOS:** Descrever o perfil epidemiológico de pacientes vítimas de queimadura, internados em Unidade de Terapia Intensiva especializada em Queimados (UTI-Q) em Hospital Terciário de Curitiba. Identificar a presença de transtornos psiquiátricos descritos no DSM-V nessa população e consequências no internamento. **METODOLOGIA:** Estudo transversal retrospectivo, realizado mediante análise observacional de prontuários de queimados internados em UTI-Q no período de Março de 2022 a Março de 2023, em Hospital Terciário. Foram analisados: sexo, idade, comorbidades declaradas pelo paciente ou familiar, tempo de internamento em UTI-Q e enfermaria, motivação e mecanismo da queimadura, grau da lesão e superfície corporal queimada. Variáveis analisadas por estatística descritiva e testes qui-quadrado para dados categóricos e T de Student para variáveis contínuas. Foram considerados significativos valores de  $p < 0,05$ . **RESULTADOS:** Foram avaliados 185 pacientes dos quais 74 (40%) apresentavam algum tipo de transtorno psiquiátrico. A média de idade da amostra total foi de 44,5 (IC 95% 41,98 - 47,04), sendo 52 indivíduos do sexo feminino (28,11%). O motivo mais comum foi relacionado a acidente (81,48%) com mecanismo envolvendo álcool (27,57%), seguido de choque elétrico (19,46%). A média de superfície corporal queimada foi de 29,78% (IC95% 26,94-32,62). 17 pacientes (9,19%) tiveram lesão decorrente de suposta tentativa de suicídio. O tempo médio de internamento na UTI foi de 13,3 dias (IC95% 11,32-15,21), sendo que 22,16% dos pacientes foram a óbito. Ao se analisar o grupo com transtorno psiquiátrico, a média de idade foi de 44,7 (IC95% 39,8 - 48,1) e a porcentagem de pacientes femininos foi 39,19%. Nota-se que a maior parte das mulheres apresentava algum transtorno antes do internamento (55,77%) ( $p$ -valor  $< 0,05$ ). Transtornos aditivos envolvendo tabagismo e etilismo foram os mais prevalentes, independente do sexo, seguidos de transtorno bipolar entre as mulheres e abuso de outras substâncias entre os homens. O mecanismo de queimadura mais observado foi por álcool (29,87%) seguido de fogo somente (20,78%) e choque elétrico (20,78%). O tempo médio de internamento na UTI foi de 15 dias (IC95% 11,62-18,37) e 20,27% dos pacientes desse grupo faleceram. Entre os pacientes com transtorno, 7 (9,73%) deles foram internados por lesão decorrente de suposta tentativa de suicídio, entretanto não houve diferença significativa entre os grupos com e sem transtorno psiquiátrico. **CONCLUSÃO:** Pacientes masculinos, de média

<sup>1</sup> Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, rafabinotto@hotmail.com

<sup>2</sup> Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, elisaklughansen@hotmail.com

<sup>3</sup> Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, rairanieri20@gmail.com

<sup>4</sup> Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, valeriamaeda@yahoo.com.br

<sup>5</sup> Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, claudiiofrank@hotmail.com

etária de 44,5 anos, são os mais prevalentes. Acidentes com álcool são a causa mais comum de internamento e, dentre os transtornos aditivos, tabagismo e etilismo foram os mais preponderantes. Em seguida, nas mulheres, houve predomínio de transtorno bipolar, enquanto, nos homens, prevaleceu o abuso de outras drogas. Como consequências dos distúrbios psiquiátricos no internamento, não foi verificada diferença estatisticamente significativa, seja no tempo de internamento, seja na taxa de mortalidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** Unidade de Queimados, Queimaduras, Transtornos Mentais