

# I ENCONTRO CAPIXABA DE PÓS-GRADUAÇÃO E TEMAS EMERGENTES EM MEDICINA VETERINÁRIA

100% ONLINE



UNIVERSIDADE  
VILA VELHA

FAPEX

8 A 13  
AGO  
2022

## REMOÇÃO CIRÚRGICA DE DOIS CORPOS ESTRANHOS DISTINTOS EM CÓLON MENOR DE POTRO MANGALARGA MARCHADOR - RELATO DE CASO

I Encontro Capixaba de Pós-Graduação e Temas Emergentes em Medicina Veterinária, 1ª edição, de 08/08/2022 a 13/08/2022  
ISBN dos Anais: 978-65-81152-82-6

**LEITE; Lais Cipriano Leite<sup>1</sup>, MARQUES; Camila Marques<sup>2</sup>, JUNIOR; Silas Junior<sup>3</sup>, OLIVEIRA; Alvaro de paula lage de<sup>4</sup>, QUEIROZ; Julia queiroz<sup>5</sup>, MODESTO; Mariana<sup>6</sup>**

### RESUMO

A obstrução intestinal por ingestão de corpo estranho é uma das causas de cólica em equinos. O objetivo deste trabalho é relatar um caso de obstrução de cólon menor em potro causada por dois corpos estranhos distintos. Um potro de 200kg com 7 meses de idade, da raça mangalarga machador chegou ao Hospital Veterinário da UVV com distensão abdominal bilateral, hipomotilidade, frequência cardíaca 120 bpm, frequência respiratória 40 mrm, mucosas hiperêmicas, TPC 3 segundos e desidratação estimada em 10%. Foi relatado que a potra vivia em piquete e defecava pedaços de sacola frequentemente. O animal veio a decúbito com sinais agudos de dor abdominal durante o atendimento. Foi realizado sondagem nasogástrica, controle da dor com detomidina (0,015 mg/kg/IV) e butorfanol (0,03 mg/kg/IV), obtendo uma melhora temporária do animal. O animal foi encaminhado para tratamento cirúrgico, sendo observado o ceco repleto de gás, compactação de cólon ventral direito e cólon transversal. Foi realizada enterotomia na flexura pélvica. Ainda, foi verificada a presença de corpo estranho obstrutivo em cólon menor (causa primária). Foi realizado a ordenha do conteúdo no sentido aboral, lubrificado com SF 0,9%, até sua saída no ânus, sendo encontrado sacola plástica e tecido envolto por fezes. A cirurgia foi concluída. No pós-operatório foi instituída a terapia com ceftiofur, gentamicina, metronidazol, DMSO 10%, buscopan, heparina e omeprazol. Além disso foram realizadas limpezas diárias e posteriormente colocação do curativo abdominal. Após dez dias de pós cirúrgico foram retirados os pontos de pele e o animal obteve alta médica.

**PALAVRAS-CHAVE:** equino, cólon menor, obstrução, corpo estranho, plástico

<sup>1</sup> Universidade Vila velha , lala.ciprianoite@gmail.com  
<sup>2</sup> Universidade Vila velha - UVV, lala.ciprianoite@gmail.com  
<sup>3</sup> Universidade Vila velha - UVV, lala.ciprianoite@gmail.com  
<sup>4</sup> Universidade Vila velha - UVV, alvaro.lage@uvv.br  
<sup>5</sup> Universidade Vila velha - UVV, lala.ciprianoite@gmail.com  
<sup>6</sup> Universidade Vila velha - UVV, lala.ciprianoite@gmail.com